

## **Gråsiska (*Carduelis flammea*)**

Gråsiskan är i storlek och form som en hämpling men med mer kluven stjärt. En fågel med stor utbredning på norra halvklotet. Det finns många "underarter" och huruvida de är raser eller arter vet man inte riktigt ännu. I vårt område kan brunsiska förekomma. Det har genom åren märkts många gråsiskor vilket tyder på att det är en tämligen vanlig art.

På vintrarna kan man se flockar med siskor klängandes i trädgrenar. Ofta är det björk då björkfrön tillika med olika former av ogräsfrön utgör huvudfödan under vintern. Flockarna förflyttar sig efter födotillgång och många av dem vistas i södra delen av vårt land under vintern.

Fågeln är en markhäckare och boet byggs av honan. Ofta läggs ca 5 blåaktiga ägg med bruna prickar som ruvas i ca 10 dagar. Ungarna som föds upp på insekter blir flygga efter 12-14 dagar.



foto P Kinberg

### **2014**

Ännu ett riktigt gammalt fynd av gråsiska. Denna märktes i Norge den 9 september 2013 på Karmøy Blixhavn Rogaland som ungfågel.

Kontrollerades av Sara Elg 23 april 2014 och släpptes.

Inte förrän nu har vi fått svar från Riksmuseets databas. Mellan stationerna är det 352 km och den förflutna tiden var 232 dagar.

Jag valde ändå att lägga in den under 2014

**2015.**

**Gråsiska**(*Carduelis flammea*)

Märk Hona märkt som fjolåring eller äldre Grosshamn den 30 maj 2013. Faktum är att det är den fotograferade individen.

Återfynd och kontroll i Seebenisch Leipzig Tyskland den 31 oktober 2015. Under fynddetaljer har man sagt troligen underarten cabaret dvs brunsiska”

Således har det förflutit 2 år och 154 dagar sedan ringmärkningen. Med tanke på att fågeln märktes som 2+ så har denna hona en aktningvärd ålder på närmare 4 år.